

Benta[®] 480 SL

Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására

Hatóanyag tartalom: 480,0 g/l bentazon (40,4 m/m %)

Szerforma: SL – vízdíható koncentrátum

Engedélyokirat száma: NÉHIB 04.2/773-2/2013

Forgalmazási kategória: II

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

A növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th. Road, Bandra (West),
Mumbai 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa és a hazai forgalmazó:
Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Telefon: 06 1 631 9093, Fax: 06 1 220 6855

Gyártási idő: Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám: Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év
eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Az alkalmazás során előírt egyéni védőfelszerelés:

Permetlé előkészítőknak védőkesztyű. **Permetlé kijuttatóknak** védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: **Bőrrel való érintkezés esetén** a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: **Tüneti megfigyelő** kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Szenzibilizáló anyagot (bentazon) tartalmaz. Túlérzékeny személynél **allergiás reakciót** válthat ki!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉ ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI:



Figyelem

Figyelmeztetés:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke patkányon: >300,0 mg/ttkg és <2.000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége: mérsékelten veszélyes

Méhveszélyessége: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy bentazont tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál többször és/vagy nagyobb mennyiségben, mint 960 g bentazon! (Maximum 960 g bentazon hatóanyag/ha/év)!

- SPe 2** **A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!**
- SPe 3** **A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepterület) biztonsági övezetet!**

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
		készítmény (l/ha)	permetlé (l/ha)	
Borsó (zöld, száraz)	Magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0	200 - 300	Első valódi lomblevél megjelenése - 2 lombleveles állapot (BBCH 10-12)
Bab (zöld, száraz)	Magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0	200 - 300	1 - 3 lombleveles állapot (BBCH 11-13)
Szója	Magról kelő kétszikű gyomnövények	2,0	200 - 300	1 - 3 lombleveles állapot (BBCH 11-13)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Borsóban (zöld, száraz) a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, az első valódi lomblevél megjelenésétől a 2. lomblevél kifejlődéséig (BBCH 10-12), a magról kelő *kétszikű gyomfajok* 2-4 valódi leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. Borsóban a készítmény *kombinálható* egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott dóziséval. Kombináció esetében mindig *figyelembe kell venni* a kombinációs partner kijuttatási paramétereit!

Babban (zöld, száraz) a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 lombleveles állapotában (BBCH 11-13), a magról kelő *kétszikű gyomnövények* 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell elvégezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Babban a kezelést követően levélfoltosság, depresszió léphet fel, de ezt a növények rövid időn belül kiheverik. *Fajtaérzékenység előfordulhat.*

Szójában a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 lombleveles állapotában (BBCH 11-13), a magról kelő *kétszikű gyomnövények* 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell elvégezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Szójában a készítmény *kombinálható* egyéb, a kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott dóziséval. Kombináció esetében mindig *figyelembe kell venni* a kombinációs partner kijuttatási paramétereit!

25 °C feletti hőmérsékleten, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos a készítménnyel permetezni!

A készítményt alacsony nyomáson, közepes cseppmérettel kell kijuttatni.

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: **Zöldbabban 35 nap, zöldborsóban 40 nap, száraz hüvelyesekben (borsó, bab) és szójában előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.**

EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A Benta[®] 480 SL a gyomnövények *2-4 leveles* fenológiai állapotánál kijuttatva biztosítja a legjobb biológiahatást. Ha a száraz gyomnövényekre kipermetezett készítmény *6-8 órán belül megázik*, akkor biológia *hatáscsökkenéssel* kell számolni.

Eső után csak *2-3 nappal később* szabad kipermetezni a Benta[®] 480 SL-t, ha meggyőződünk arról, hogy a kultúrnövényen a *védő viaszréteg* már regenerálódott. **Magas 25,0 °C feletti** hőmérsékleten a fitotoxicitás veszélye miatt a készítményt *tilos kipermetezni!*

A permetezést lehetőleg *közepes cseppekkel* (cseppátmérő 400-600 μ) végezzük, hogy a négyzetcentiméterenkénti cseppszám ne haladja meg az 30-50 db-ot.

Szuperszelektív egyszikűirtó készítményekkel tankkeverékben a Benta[®] 480 SL-t *kipermetezni tilos!* A szuperszelektív egyszikűirtó készítményt vagy a Benta[®] 480 SL tervezett alkalmazása *előtt 4-6 nappal*, vagy az alkalmazása *után 4-6 nappal* juttathatjuk ki *önmagában!*

Rovarölőszeres kezelést csak Benta[®] 480 SL kijuttatását követő *egy hét múlva* végezhetünk!

Nedvesítőszerrel tankkeverékben a Benta[®] 480 SL kijuttatását *nem javasoljuk!*

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak **megfelel**, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget **nem vállalunk!**

Tilos a készítmény kiszerelese a gyártó, illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!