

Quick[®] 5 EC

Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen

Hatóanyag tartalom: 50,0 g/l quizalofop-P-etil (5,32 % m/m)

Szerforma: EC – emulzióképző koncentrátum

Engedélyokirat száma: MgSzHK 04.2/284-1/2012

Forgalmazási kategória: **II**

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

A növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője és a növényvédő szer forgalmazója:
Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Telefon: 06 1 374 9000, Fax: 06 1 374 9001

Gyártási idő: Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám: Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év
eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Permetlé előkészítőknek védőkesztyű. **Permetlé kijuttatóknak** védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel legalább 15-20 percig kell öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉ ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI:



Figyelmeztetés:

Veszély

Veszélyes alkotóelemek:

Benzolszulfonsav kalcium só, etoxilált kókuszplaj alkohol, naftalin

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke patkányon: >2.000,0 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége: kifejezetten veszélyes!

Méhekre való veszélyessége: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolása: nem jelölésköteles

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P261 Kerülje a permet belélegzését

P280 Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő használata kötelező

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz

P331 TILOS hánytatni

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P405 Elzárva tárolandó

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH-mondat: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

Különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélytől függően használható.

A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

Felhasználás előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyiség		Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
Őszi káposztarepce	Magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények	0,7 – 1,0	250 - 300	1	-	6 leveles állapot
	Fenyércirok	0,8 – 1,2				
	Tarackbúza	2,0				
	Gabona árvakelés	0,4 – 0,6				Bokrosodás kezdete
Cukorrépa	Magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények	0,7 – 1,0	250 - 300	1	-	10 leveles állapot
	Fenyércirok	0,8 – 1,2				
	Tarackbúza	2,0 – 2,5				
Napraforgó	Magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények	0,7 – 1,0	250 - 300	1	-	6 leveles állapot
	Fenyércirok	0,8 – 1,2				
	Tarackbúza	2,0 – 2,5				

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!

Őszi káposztarepcebén a magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények elleni kezelést a kultúrnövény 4-6 leveles koráig kell elvégezni.

Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erős árvakelés, vagy kissé megkésített kezelés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.

Cukorrépában a kezelést magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények ellen a kultúrnövény 4-6 leveles korától 8-10 leveles fejlettségéig kell elvégezni.

Napraforgóban a kezelést magról kelő valamint évelő egyszikű gyomnövények ellen a kultúrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.

A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, az évelő egyszikűek az intenzív növekedési szakaszukban 10-15 cm-es fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésített kezelés esetén az engedélyokiratban megadott magasabb dózisokban kell felhasználni.

A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: *Őszi káposztarepcében, napraforgóban és cukorrépában az előírt növényvédelmi technológia szerinti alkalmazás esetén **nem szükséges***

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

Őszi káposztarepcében a *gabona árvakelés* 1-3 leveles fejlettségénél a **0,6 l/ha-os adag, 3-5 leveles fejlettségénél, pedig az **1,0 l/ha**-os adag **alkalmazását javasoljuk!****

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak **megfelel**, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget **nem vállalunk!**

Tilos a készítmény kiszerezése a gyártó, illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!