Shametrin™ *70 WG*

Gyomirtó permetezőszer burgonya magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen

Szerforma:	Vízben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyag tartalom:	700 g/kg metribuzin (70,0 % m/m)
Engedélyokirat száma:	NéBIH 04.2/2291-1/2015
Forgalmazási kategória:	**II.**

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

A növényvédő szer gyártója:
Sharda Cropchem Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa és a termék forgalmazója:
Sharda Hungary Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 105.
Telefon: 06 1 631 9093, Fax: 06 1 220 6855

Gyártási idő: Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám: Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

™ A Sharda Cropchem Ltd. bejegyzett kereskedelmi neve

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés **előkészítőknek;** *védőkesztyű,* **kijuttatóknak;** *védőkesztyű, védőruha.*

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Figyelem

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	**> 2.000 mg/ttkg**
Vízi szervezetekre való veszélyessége:	**kifejezetten veszélyes**
Méhekre való veszélyessége:	**nem jelölésköteles**
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

H410	**Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz**
P102	**Gyermekektől elzárva tartandó**
P270	**A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni**
P280	**Védőkesztyű, védőruha használata kötelező**
P391	**A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni**
P501	**A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges**

Különleges S mondatok:

SP 1	**A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!** (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 2	**A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!**
SPe 3	**A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől *50 m* távolságban tartson meg egy kezeletlen, benne *20 m* növényzettel (zárt gyep) borított biztonsági övezetet!** **A nem-cél növények védelme érdekében a mezőgazdasági földterülettől *5 m* távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!**

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!

CSEBER
csomagolóeszköz begyűjtési rendszer

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség szer *(l/ha)*	víz *(l/ha)*	Kezelések maximális száma	Kezelés ideje *(fenológiához viszonyítva)*
Burgonya	Magról kelő kétszikű gyomnövények	0,75	200 - 300	2	Kelés előtt, a szekunder bakhátak kialakítása után
		0,50			Kelés után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Burgonyában a készítményt *kelés előtt* 1,0 %-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon *0,75 kg/ha* mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. A megfelelő hatékonysághoz a permetezés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
Állományban a burgonya *kelése után*, amikor a hajtások hossza átlagosan *5-10 cm*, *0,5 kg/ha* dózisban kell alkalmazni.

Egyes burgonyafajták érzékenyek a *metribuzin* hatóanyagra, a gyomirtó szer érzékenységről *tájékoztatást kell kérni* a fajtatulajdonostól.

Burgonyában 25,0 °C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a fokozott fitotoxicitási veszély miatt!

A metribuzin hatóanyag a HRAC „C" herbicidcsoporton belül az asszimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: **Nem engedélyezett**

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A készítményt *biológia hatékonysága* fokozásható, a *Silico* felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazásával.

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

Burgonya	Magról kelő kétszikű gyomnövények	0,75	200 - 300	2	Kelés előtt, a szekunder bakhátak kialakítása után
		0,50			Kelés után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Burgonyában a készítményt *kelés előtt* 1,0 %-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon *0,75 kg/ha* mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. A megfelelő hatékonysághoz a permetezés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
Állományban a burgonya *kelése után*, amikor a hajtások hossza átlagosan *5-10 cm*, *0,5 kg/ha* dózisban kell alkalmazni.

Egyes burgonyafajták érzékenyek a *metribuzin* hatóanyagra, a gyomirtó szer érzékenységről *tájékoztatást kell kérni* a fajtatulajdonostól.

Burgonyában 25,0 °C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a fokozott fitotoxicitási veszély miatt!

A metribuzin hatóanyag a HRAC „C" herbicidcsoporton belül az asszimmetrikus triazinok hatóanyagcsoportba sorolható.

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:

Lémennyiség 300 l/ha = 3,0 l/100 m^2

Dózis	Koncentráció
0,75 kg/ha = 7,5 g/100 m^2	*25 g / 10 l permetlé*
0,50 kg/ha = 5,0 g/100 m^2	*17 g / 10 l permetlé*

Légi kijuttatás: **Nem engedélyezett**

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A készítményt *biológia hatékonysága* fokozásható, a *Silico* felületi feszültség csökkentő adalékanyag alkalmazásával.

Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!