

Tebusha[®] 25 EW

Gombaölő permetezőszer kalászosok levél és kalászbetegségei, borszőlő és őszi káposztarepce gombabetegségei ellen, valamint repce fagykár csökkentésére

Szerforma:	Olajemulzió vizes fázisban (EW)
Hatóanyag tartalom:	250,0 g/l tebukonazol (24,2 % (m/m))
Engedélyokirat száma:	MgSzH 04.2/6149-1/2011, NÉBIH 04.2/2887-2/2014
Forgalmazási kategória:	II

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!

A növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Telefon: 06 1 374 9000, Fax: 06 1 374 9000

A növényvédő szer kizserelője:

Chemark Kft.
8182 Peremarton-gyártelep, Peremarton
Telefon: 06 88 455 045, Fax: 06 88 455 465

Gyártási idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Kizserelési idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám:

Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év

eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban

50 ml; 200 ml; 1,0 liter; 5,0 liter

® A Sharda Worldwide Export Pvt. Ltd. bejegyzett márkanéve

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVORENDSZABÁLYOK:

A munkavégzés előtt, alatt és után alkoholt fogyasztani nem szabad.

Egyéni védőfelszerelés **előkészítőknak; védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, kijuttatóknak; védőkesztyű, védőruha, védő lábbeli.**

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel legalább 15-20 percig kell öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: Speciális antidótuma nincs.

Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld száma:

06 80 201 199

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

Veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

> 2.000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

közepesen veszélyes

Méhveszélyessége:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

H mondatok:

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H361D	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P mondatok:

P261	Kerülje a permet belélegzését
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P405	Elzárva tárolandó
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

Különleges S mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
------	--

SPo 2
SPe 3

Használat után minden védőruhát ki kell mosni!

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5,0 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélytől függően használható.

Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!



CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
		szer (l/ha)	víz (l/ha) mennyiség			
Kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)	Levél- és kalászbetegségek	1,0	250 - 400	2	21	Virágzás
Őszi káposztarepce	Fagykár csökkentés Plenodómuszos és alternáriás betegségek, fehér- és szürkepenész	0,50 – 1,0	250 - 400	1	21	Tőlevélrózsás állapot
		0,75 – 1,0		2		Virágzás vége
Borszőlő	Lisztharmat, szürkepenész	0,4	400 - 800	3	14	Zsendülés

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Kalászosokban a kezeléseket megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz *szárbaindulás kezdetén*, továbbá a *kalászhányás végén*, *virágzás kezdetén* végzett egy-egy permetezéssel.

Őszi káposztarepceben a készítményt először *összel, 4-6 leveles állapotban* érdemes felhasználni a *fagykár okozta veszteségek csökkentésére*. A készítményt betegségek ellen *virágzás elején és végén* célszerű kijuttatni.

Borszőlőben *szőlőlisztharmat* ellen, preventív jelleggel, 3 alkalommal, a *virágzástól* kezdve ajánlatos védekezni. *Szürkepenészes rothadás* ellen a készítmény hatása mérsékelt, ezért járványveszélyes időszakban más, a kultúrában engedélyezett gombaölő szerrel *kombinációban* célszerű kijuttatni.

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászosokban **35 nap**, őszi káposztarepceben **60 nap**, borszőlőben **14 nap**.

EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak **megfelel**, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget **nem vállalunk!**

Tilos a készítmény kiszérése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!